n.° 1
reçu le 30. Xbre. 1736.

Si l'on doit amputer le Carcinome des mamelles vulgairement nommé cancer ::

Comme donc la vie et la santé, ne se soutiennent que par le juste arrangement des corps fibreux, du sang arteriel, et venal et de la Limphe, liqueurs renfermées dans differens Canaux et qui coules sans cesse pour l'entretien des organes humains.
separé par le Chile

Ces vaisseaux, forment en certaines parties du Corps, un tassis ou entortillement en forme de Corps rond, enveloppé d'une tunique tres deliée; des quelles sort un Canal, d'ou Coule une liqueur toutte differente du sang.

Ces entortillemens ou tassis sont nomé pa les anatomistes anciens et quelques modernes glandes, qui sont vasculaires ou Conglomerées vesiculaires ou Conglobées.

Ces differens plotons de tuyaux, plus apparent et gros d'autres mamelles des femmes que dans celles des hommes et dont l'usage est de filtrer separer, et verser dans leurs Canaux excretoires, une liqueur, blanche, rougeatre, verdatre, sereuse et aqueuse.

Lorsque ces vaisseaux se trouvent remplis d'un sang noir et epais, quils gonflent et elevent la partie, changent la Couleur de la peau, la rendent dure sans douleur manifeste, on doit appeller cette maladie scirre.

S'il se trouve que la limphe fermente avec les acides du sang dans ces vaisseaux soit par les pointes irregulieres du sang, ou par quelque coup, chutte ou froissement qui ont obstrués ces vaisseaux, et empechent l'ecoulement de leurs excretions, la limphe devient acide, les parties fixes, grossieres et tartareuse du sang fermentent irregulierement, gonflent et tendent les vaisseaux, ce qui fait sentir une dureté autour, elevent la partie occasione une douleur inquiettante, et fait une tumeur que l'on appelle Carcinome.

Le long sejour que fait ces liqueurs dans ces vaisseaux et sortiendes y Croupit a la fin, ronge et dechire leur tuniques, ulcere la peau et fait un Cancer ulceré.

Les mamelles des femmes estant plus sujettes a cette maladie, non seulement a Cause de la structure mais encore, par la suppression du sang menstruelle qui Corrompt la masse du sang, et par le defaut de filtration du lait dans cette partie.

Le Chirurgien doit avoir deux point de veüe dans la guerison du Carcinome dans la possibilité ou Impossibilité.

dans son Impossibilité 1° si la tumeur, est d'un trop grand volume, quelle soit adherente, non seulement aux muscles, pectoraux, et intercostaux, mais aux costes mesmes ny de furieuses vers laisselle.
2.° si la tumeur epanchée a ulceré profondement le Corps de la mamelle.
3.° si l'age, les forces, et le temperament ne le permettent point.
en ce cas, il faut se servire de la Cure palliative

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

carton 3
d. 1 n.° 1

qui doit Consister dans les remedes generaux et dans ceux qui retablissent les beaumes du sang:

dans la possibilité et le terrine de la Cure radicative:
la tumeur, les forces, l'age, et le temperament estant favorables au Chirurgien qui aura considéré les trois temps, ce qu'il faut faire, devant, dans, et apres l'operation:

1°. si la tumeur est petitte, ou de peu de volumes et vaillante, il faut faire une incision avec le bistouri sur la peau, selon son volume, la decouvrire, la dissequer et emporter la tumeur, si il se trouve des vaisseaux on les lie, remplire la playe de plumaceaux garnies de poudres astringentes, l'emplastre et le scapulaire:

2°. si la tumeur est d'un volume plus Considerable, sans estre adherente, mais vaillante, et que les teguments ne soient point ulceré, ny alteré on fait une incision Cruciale sur la peau selon le volume de la tumeur et sans entrer dans le Corps de la tumeur, l'on separe les quatres lambeaux l'on embrasse la tumeur chancreuse avec la tenette ~~[illegible]~~, et on la Coupé avec le bistouri et on garnier egalement la playe de plumaceaux de poudres astringentes, l'emplastre et le scapulaire:

3°. si la tumeur occupe tout le Corps de la mamelle, vaillante et non adherente il faut se servire de la ligature, le malade assis dans un fauteuille sans bras, un serviteur prendera le bras du Costé du mal le levera en haut, en le soignant en arriere, afin que le grand pectoral se retirant la tumeur paroisse davantage on passera une aiguille enfillée d'un file fort, dans la base de la mamelle, on Coupera le fil et on repassera encore l'aiguille dans la mamelle pour faire croiser les fils, on lie ces quatre bouts de fil ensemble et l'on en fait une anse pour lever la tumeur puis avec un bistouri bien trenchant, l'on Coupe tout autour jusques dans le Corps du grand pectoral, on Commence son incision a la partie Inferieure pour finir aux vaisseaux proche l'aisselle, on glissant adroitement le bistouri et laisser un petit lambeau afin d'arreter plus facilement le sang remplire la playe de plumaceaux garnies de poudres astringentes, l'emplastre et le scapulaire:

4°. si la peau de la tumeur est ulceré et que la tumeur soit dure et adherente, la tumeur soutenüe fermé soit par une fourchette, ou des pinces ou bien que l'operateur puisse l'empoigner et la tenir ferme de sa main gauche, et de la droitte avec un ~~[illegible]~~ Couteau Courbe et bien trenchant, commencer par la partie Inferieure et finire par la superieure, pour differer l'hemorragie, jusqu'a ce que l'on soit parvenüe aux vaisseaux mammaires qu'il feront Coupées les dernieres, et laisser une langue de chaires afin d'en faire la

Ligature, avec ce couteau, la tumeur de la mamelle on coupé d'un seul coup. on Remplit, la playe de plumaceaux garnies de poudres astringentes, Lemplastre et le scapulaire.

nunc et unquam

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

~~N° 4~~ 6

n°. 1.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

Carton 3
2 1
N° 1